

永农委发〔2025〕39号

重庆市永川区农业农村委员会

关于发布永川区 2025 年杂交水稻杂交玉米 主导品种推荐的通知

各镇人民政府、街道办事处，委属相关单位：

为全面落实国家粮食安全战略部署，加快推进我区粮油产业高质量发展，促进农业提质增效和农民持续增收，根据《重庆市“两杂”主导品种推荐办法》及《重庆市 2025 年杂交水稻、杂交玉米主导品种推荐公告》，结合我区农业生产实际，经研究，决定推荐 2025 年杂交水稻主导品种 13 个、杂交玉米主导品种 9 个（清单见附件 1，简介见附件 2）。请各镇街结合实际，进行广泛宣传。特此通知。

附件：1.重庆市永川区 2025 年推荐杂交水稻杂交玉米主导
品种名录
2.重庆市永川区 2025 年推荐杂交水稻杂交玉米主导
品种简介

重庆市永川区农业农村委员会

2025 年 2 月 21 日

（此件公开发布）

附件 1

重庆市永川区 2025 年度杂交水稻杂交玉米主导品种名录

一、杂交水稻主导品种		
序号	品种名称	审定编号
1	宜香优 2115	国审稻 2012003 国审稻 20210119
2	荃优 1606	国审稻 20206016
3	泰优 808	国审稻 20200134
4	创两优丰占	国审稻 20190066
5	野香优海丝	渝审稻 20200019
6	大两优 111	渝审稻 20200001
7	荃优丝苗	国审稻 20180012 国审稻 20242078
8	川种优 3877	国审稻 20186048
9	晶两优 534	国审稻 2016605 国审稻 20190033
10	荃 9 优 2 号	国审稻 20226020
11	神农优 446	渝审稻 20200011
12	忠香优 904	渝审稻 20200017

13	深两优 5814	渝引稻 2011007 国审稻 20170013
二、杂交玉米主导品种		
序号	品种名称	审定编号
1	先玉 1171	渝审玉 20170006
2	辽禾 308	渝审玉 20190005 国审玉 20200435
3	劲单 3 号	渝审玉 20200017
4	康农玉 109	渝备玉 2019040
5	晶玉 719	渝审玉 20200029
6	梦玉 298	国审玉 20216218
7	犇玉 1 号	渝审玉 20210004
8	渝单 59	渝审玉 20210017 国审玉 20220474
9	渝甜糯 990	国审玉 20220583

附件 2

重庆市永川区 2025 年推荐杂交水稻杂交玉米 主导品种简介

一、杂交水稻主导品种

1、宜香优 2115（国审稻 2012003）：籼型三系杂交水稻品种，全生育期 156.7 天，米质达到国家《优质稻谷》标准 2 级，中感稻瘟病，高感褐飞虱。**建议：**（1）适宜我市（武陵山区除外）中低海拔籼稻区作一季中稻种植。（2）秧田亩播种量 10 千克，采用地膜覆盖保温育秧，秧龄 30~40 天。（3）宽窄行栽插，亩栽 1.2~1.5 万穴、基本苗 10 万左右。（4）大田以有机肥为主，氮、磷、钾肥配合施用，亩施纯氮 10 千克，氮、磷、钾比例为 1: 0.5: 0.5，重底早追。（5）浅水栽秧，深水护苗，薄水分蘖，够苗晒田，后期忌脱水过早。（6）重点做好稻瘟病、纹枯病、稻螟、稻飞虱等病虫害防治。

宜香优 2115（国审稻 20210119）：籼型三系杂交水稻品种，在武陵山区作一季中稻种植，全生育期 146.0 天，米质达到农业行业《食用稻品种品质》标准三级，抗稻瘟病，耐冷性一般。**建议：**（1）适宜我市所辖的武陵山区海拔 800 米以下稻区作一季

中稻种植。(2) 适时播种, 3 月上旬至 4 月初播种, 秧龄 40~45 天。(3) 合理密植, 宽窄行种植, 亩栽 1.2 万穴左右。(4) 肥水管理, 重底、早追, 氮、磷、钾肥配合施用, 大田要求前期浅水灌溉, 中期够苗晒田, 后期湿润管理至成熟。(5) 根据植保预测预报, 综合防治病虫害, 注意防治稻瘟病。

2、荃优 1606(国审稻 20206016): 籼型三系杂交水稻品种, 全生育期 151.3 天, 米质达到农业行业《食用稻品种品质》标准一级, 中感稻瘟病, 高感褐飞虱, 抽穗期耐热性较强, 耐冷性一般。**建议:** (1) 适宜我市(武陵山区除外)海拔 800 米以下地区作一季中稻种植。(2) 适期播种, 培育壮秧: 根据当地生态条件, 适时早播, 保证安全抽穗; 稀播匀播, 培育多蘖壮秧。(3) 适时移栽, 合理密植: 该品种分蘖中等, 每亩插足基本苗 8~9 万。(4) 科学施肥, 提高群体质量: 宜中肥水平, 亩用纯氮 11~13 千克; 重施基肥, 早施分蘖肥, 拔节前期增施钾肥, 增强植株抗逆性。(5) 合理灌溉, 适时防治病虫害: 抽穗期遇低温天气, 适时灌水保温; 注意及时防治稻瘟病、螟虫、稻飞虱等病虫害。

3、泰优 808(国审稻 20200134): 籼型三系杂交水稻品种, 全生育期 150.2 天, 米质达到农业行业《食用稻品种品质》标准一级, 中感稻瘟病, 高感褐飞虱, 抽穗期耐热性较强, 耐冷性一般。**建议:** (1) 适宜我市(武陵山区除外)海拔 800 米以下地区作一季中稻种植。(2) 根据当地生态条件, 适时早播, 大田

亩用种量 1.0 千克，秧田亩播种量 8~10 千克，稀播匀播，培育多蘖壮秧。（3）水育秧秧龄 30~40 天，插植规格 20 厘米×26 厘米，亩栽 1.25 万穴，每穴插 2 粒谷，每亩插足基本苗 6 万以上。

（4）需肥水平中等，采取重施底肥，及时追施分蘖肥，后期看苗补施穗肥的施肥方法。一般亩施纯氮 10~11 千克，氮、磷、钾用量比例为 1：0.5：0.7，重施底肥（氮肥 70%作底肥，30%作追肥），早施分蘖肥，忌后期偏施氮肥。移栽后深水活蔸，分蘖期浅水促蘖，够苗及时落水晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期干干湿湿壮籽，忌断水过早，以防早衰和影响米质。

（5）坚持强氯精浸种。根据病虫害预报，及时施药防治螟虫、稻飞虱、稻瘟病、纹枯病、稻曲病等病虫害。

4、创两优丰占（国审稻 20190066）：籼型两系杂交水稻品种，全生育期 151.8 天，米质达到农业行业《食用稻品种品质》标准二级，中感稻瘟病，高感褐飞虱，抽穗期耐热性较差，耐冷性强。**建议：**（1）适宜我市（武陵山区除外）海拔 800 米以下地区作一季中稻种植。（2）适时播种，培育壮秧。根据当地温光资源，合理安排播栽期，每亩大田用种量 1.0 千克左右，适施秧田肥，培育壮秧。（3）及时移栽，合理密植。秧龄 35 天内为宜，提倡宽行窄株栽插，栽插株行距 4 寸×9 寸或 5×8 寸，每穴 2 粒谷苗。（4）科学肥水管理，施肥做到施足底肥、增施磷钾肥。施肥做到前重、中控（适当控制氮肥用量）、后稳。一般每亩施

45%含量复合肥 25 千克,碳铵 10~15 千克,移栽 7 天内追施 5~7.5 千克尿素,晒田复水后追施钾肥 7.5~10 千克,根据苗情酌施 1.5~3 千克尿素。亩苗数达到 18 万及时排水晒田,适时重晒,在成熟前 5~6 天断水。(5) 病虫防治,注意及时防治稻瘟病、白叶枯病、稻飞虱、螟虫等病虫害。

5、野香优海丝(渝审稻 20200019): 中粳迟熟三系杂交水稻,全生育期 152.0 天,米质达到农业行业《食用稻品种品质》标准二等,中抗稻瘟病。**建议:** (1) 适宜我市海拔 800 米以下地区作一季中稻种植。(2) 渝西及沿江河谷地区 3 月上中旬播种,深丘及武陵山区 3 月下旬至 4 月初播种。(3) 每窝栽两粒谷苗,亩植 1.2~1.5 万窝。

6、大两优 111(渝审稻 20200001): 中粳迟熟两系杂交水稻,全生育期 154.5 天,米质达到农业行业《食用稻品种品质》标准二等,中抗稻瘟病。**建议:** (1) 适宜我市海拔 800 米以下地区作一季中稻种植。(2) 渝西及沿江河谷地区 3 月上中旬播种,深丘及武陵山区 3 月下旬至 4 月初播种。(3) 每窝栽两粒谷苗,亩植 1.2~1.5 万窝。

7、荃优丝苗(国审稻 20180012): 粳型三系杂交水稻品种,米质达到国家《优质稻谷》标准 2 级、农业行业《食用稻品种品质》标准二级,中感稻瘟病,感褐飞虱,抽穗期耐热性较强,耐冷性较弱。**建议:** (1) 适宜我市(武陵山区除外)海拔 800 米

以下地区作一季中稻种植。（2）适期播种，培育壮秧：根据当地生态条件，适时早播，保证安全抽穗；稀播匀播，培育多蘖壮秧。（3）适时移栽，合理密植：该品种分蘖较好，穴栽1~2粒种子苗，每亩插足基本苗6~8万。（4）科学施肥，提高群体质量：该品种具氮高效，不宜高肥，一般亩用纯氮13千克左右，基肥：追肥为6：4，增施磷、钾肥。（5）合理灌溉，适时防治病虫害，抽穗期遇低温天气，适时灌水保温。

荃优丝苗（国审稻 20242078）：籼型三系杂交水稻品种，在武陵山区作一季中稻种植，全生育期140.2天，米质达到农业行业《食用稻品种品质》标准二级，中感稻瘟病，耐冷性较弱。**建议：**（1）适宜我市所辖的武陵山区海拔800米以下稻区作一季中稻种植。（2）一般3月下旬至4月上旬播种，秧田播种量每亩10.0千克，大田亩用种量1.0—1.5千克。（3）水育秧移栽叶龄5.0叶左右，秧龄控制在40天以内；栽插株行距16.9厘米×26.6厘米，每亩插足基本苗8万以上。（4）氮、磷、钾肥配合施用，强化水浆管理，切忌断水过早。（5）秧田期主要防治稻蓟马，大田期主要防治稻纵卷叶螟和稻飞虱等病虫害。

8、川种优 3877（国审稻 20186048）：籼型三系杂交水稻品种，全生育期151.9天，米质达到农业行业《食用稻品种品质》标准二级，中感稻瘟病，高感褐飞虱，抽穗期耐热性中等，耐冷性中等。**建议：**（1）适宜我市（武陵山区除外）海拔800米以

下稻瘟病轻发区作一季中稻种植。（2）适时播种：稀播匀播培育多蘖无病虫害壮秧，移栽前适时施送嫁肥、喷送嫁药。（3）合理密植：6叶龄左右移栽，每穴插双谷粒苗，亩基本苗6~7万。（4）合理施肥：施足底肥，移栽后早施追肥，氮、磷、钾肥的比例大致为1.0：0.5：0.8；穗粒肥依苗情适施或不施，提倡施用水稻专用复合肥或复混肥，有条件最好施用农家肥。（5）移栽后浅水促分蘖，够苗及时晒田，湿润壮胎，浅水扬花，后期干湿交替，切忌断水过早。（6）病虫害防治：根据植保预测，以防为主，综合防治病虫害，生产上要注意防治稻瘟病等病虫害。

9、晶两优 534（国审稻 2016605）：籼型两系杂交水稻品种，全生育期 157.9 天，米质达到国家《优质稻谷》标准 2 级，中感稻瘟病，高感褐飞虱。**建议：**（1）适宜我市（东北部和武陵山区除外）800 米以下籼稻区作一季中稻种植。（2）根据当地生态条件，适时早播，培育多蘖壮秧。（3）水育秧秧龄 30~40 天，插植规格 20 厘米×26 厘米，亩栽 1.25 万穴，每穴插 2 粒谷，每亩插足基本苗 6 万以上。（4）需肥水平中等，采取重施底肥，及时追施分蘖肥，后期看苗补施穗肥的施肥方法。（5）移栽后深水活蔸，分蘖期浅水促蘖，当总苗数达到 24 万左右，及时落水晒田，孕穗期至抽穗期保持田面有浅水，灌浆期干干湿湿壮籽，后期不能断水过早，以防早衰和影响米质。（6）坚持强氯精浸种，预防恶苗病等种子带菌病害的发生；大田期根据病虫害预报，

及时施药防治二化螟、稻纵卷叶螟、稻飞虱、纹枯病、稻曲病、稻瘟病等病虫害；稻瘟病重发区注意防治稻瘟病。

晶两优 534（国审稻 20190033）：籼型两系杂交水稻品种，全生育期 146.1 天，米质达到农业行业《食用稻品种品质》标准三级，抗稻瘟病，中感纹枯病，高感稻曲病，耐冷性为中间型。**建议：**（1）适宜我市武陵山区海拔 800 米以下稻区作一季中稻种植。（2）适时早播，大田亩用种量 0.75 千克，秧田亩播种量 8~10 千克，稀播匀播，培育多蘖壮秧。（3）水育秧，秧苗叶龄 5.5 叶左右移栽，秧龄期 30~35 天；插植规格 20 厘米×26 厘米，亩栽 1.2~1.5 万穴，每蔸插 2~3 粒谷，每亩插足基本苗 6 万以上。（4）需肥水平中等，一般亩施纯氮 11~12 千克，氮、磷、钾用量比例为 1:0.5:0.7，重施底肥（氮肥 70%作底肥，30%作追肥），早施分蘖肥。移栽后够苗及时落水晒田，孕穗期至灌浆期保持田面有浅水。（5）加强防治稻曲病，注意及时施药防治稻瘟病、纹枯病、螟虫、稻飞虱等病虫害。

10、荃 9 优 2 号（国审稻 20226020）：籼型三杂交水稻品种，全生育期 151.3 天，米质达到国家《优质稻谷》标准 2 级，中感稻瘟病，高感褐飞虱，耐热性较强，耐冷性较弱。**建议：**（1）适宜我市（武陵山区除外）800 米以下籼稻区作一季中稻种植。（2）适时播种，一般 3 月下旬至 4 月上旬播种，秧田播种量每亩 10-12 千克，大田亩用种量 0.8-1.0 千克。（3）水育秧移栽叶

龄 5.0 叶左右,秧龄控制在 35 天以内;栽插株行距 16.7 厘米×26.6 厘米,每亩插足基本苗 8 万以上。(4)科学施肥,抽穗期遇低温阴雨天气注意灌深水保温。(5)重点防治稻瘟病、纹枯病、白叶枯病、稻飞虱、螟虫等病虫害。

11、神农优 446 (渝审稻 20200011)：中粳迟熟三系杂交水稻,全生育期 155.1 天,米质达到农业行业《食用稻品种品质》标准一级,抗稻瘟病。**建议：**(1)适宜我市海拔 800 米以下地区作一季中稻种植。(2)渝西及沿江河谷地区 3 月上中旬播种,深丘及武陵山区适宜 3 月下旬至 4 月初播种。(3)每穴栽两粒谷苗,每亩 1.2~1.5 万窝左右。

12、忠香优 904 (渝审稻 20200017)：中粳迟熟三系杂交水稻,全生育期 150.0 天,米质达到农业行业《食用稻品种品质》标准二级,抗稻瘟病。**建议：**(1)适宜我市海拔 800 米以下地区作一季中稻种植。(2)渝西及沿江河谷地区 3 月上中旬播种,深丘及武陵山区适宜 3 月下旬至 4 月初播种。(3)每穴栽两粒谷苗,每亩 1.2~1.5 万窝左右。

13、深两优 5814 (渝引稻 2011007)：中粳迟熟两系杂交水稻,全生育期 162.5 天,米质达到国家《优质稻谷》标准 2 级,中感稻瘟病。**建议：**(1)适宜我市海拔 800 米以下地区作一季中稻种植。(2)渝西及沿江河谷地区 3 月上中旬播种,深丘及武陵山区适宜 3 月下旬至 4 月初播种。(3)每穴栽两粒谷苗,

每亩 1.2 万穴左右。（4）种子应进行包衣处理，注意防治稻瘟病。（5）黔江、荣昌和稻瘟病重发区慎用。

深两优 5814（国审稻 20170013）：籼型两系杂交水稻品种，全生育期 158.7 天，米质达到国家《优质稻谷》标准 2 级，感稻瘟病，高感褐飞虱。**建议：**（1）适宜在我市（武陵山区除外）海拔 800 米以下地区作一季中稻种植，稻瘟病重发区不宜种植。

（2）适时早播、稀播，培育多蘖壮秧：大田亩用种量 1~1.20 千克。（3）适时早栽，合理密植：秧龄 35~40 天，亩插 1 万至 1.5 万穴，每穴 2~3 粒谷，亩基本苗 5 万至 6 万。（4）施肥原则：科学配方施肥，重底早追，氮、磷、钾配合施用，科学管水；提倡施用水稻专用复合肥或有机肥。（5）根据植保预测预报综合防治病虫害，注意防治稻瘟病。

二、杂交玉米主导品种

1、先玉 1171（渝审玉 20170006）：中熟杂交玉米，在区试 3000 株/亩密度下，出苗至成熟平均 119 天，抗穗腐病，中抗小斑病、纹枯病和丝黑穗病，感大斑病，高感茎腐病。**建议：**（1）适宜在我市海拔 700 米以下地区种植。（2）3 月上中旬播种育苗为宜，亩植密度 3000 株左右，注意防治茎腐病。

2、辽禾 308（渝审玉 20190005）：中熟杂交玉米，在区试 3000 株/亩密度下，出苗至成熟平均 122 天，中抗大斑病、纹枯病、茎腐病和穗腐病，感小斑病。**建议：**（1）适宜我市海拔 800

米以下地区种植。(2)3月上中旬播种育苗为宜，亩植密度3000株左右。

辽禾 308 (国审玉 20200435)：西南春玉米(中低海拔)组出苗至成熟120.5天，感大斑病，感灰斑病，中抗茎腐病，感穗腐病，抗小斑病，感纹枯病，感南方锈病。**建议：**(1)适宜我市海拔800米及以下的丘陵、平坝、低山地区种植。(2)3月上旬至4月中旬播种育苗为宜，亩种植密度3000株左右，重施底肥和攻苞肥。

3、劲单 3 号 (渝审玉 20200017)：中熟杂交玉米，出苗至成熟平均118天，中抗大斑病、小斑病和穗腐病，感纹枯病和茎腐病。**建议：**(1)适宜我市海拔800米以下地区种植。(2)3月上中旬播种育苗为宜，亩植密度3000株左右，注意防治纹枯病和茎腐病。

4、康农玉 109 (渝备玉 2019040)：杂交玉米，出苗至成熟平均131.1天，抗大斑病、小斑病、纹枯病、茎腐病，中抗穗腐病。**建议：**(1)适宜我市海拔800米以上地区种植。(2)适宜春播，密度为3000株左右。(3)施肥和管理同一般单交种，重施底肥，适时施用拔节肥，猛攻穗肥。(4)及时防治病虫害。

5、晶玉 719 (渝审玉 20200029)：中熟杂交玉米，出苗至成熟平均127天，中抗大斑病、小斑病和穗腐病，感纹枯病和茎腐病。**建议：**(1)适宜我市海拔800米以上地区种植。(2)3

月下旬至4月初播种育苗为宜，亩植密度3000株左右，注意防治纹枯病和茎腐病。

6、梦玉 298（国审玉 20216218）：中熟杂交玉米，出苗至成熟平均121天，感大斑病、灰斑病、穗腐病、小斑病、纹枯病、南方锈病，中抗茎腐病。**建议：**（1）适宜我市海拔800米以下地区种植。（2）中等肥力以上地块种植，3月上旬~4月中旬播种，种植密度2800株/亩。（3）注意防治大斑病、小斑病、纹枯病，穗腐病重发区慎用。

7、彝玉 1 号（渝审玉 20210004）：中熟杂交玉米，出苗至成熟平均127天，中抗小斑病和茎腐病，感大斑病、纹枯病和穗腐病。**建议：**（1）适宜我市海拔800米以下地区种植。（2）3月上中旬播种育苗为宜，亩植密度3000株左右，注意防治大斑病、纹枯病和穗腐病。

8、渝单 59（渝审玉 20210017）：中熟杂交玉米，出苗至成熟131天，抗大斑病，中抗小斑病、茎腐病和穗腐病，感纹枯病。**建议：**（1）大豆玉米带状复合种植推荐品种。（2）适宜我市海拔800米以上地区种植。（3）3月下旬至4月上旬播种育苗为宜，亩植密度3000株左右，注意防治纹枯病。

渝单 59（国审玉 20220474）：西南春玉米（中低海拔）组出苗至成熟117天，感大斑病，抗茎腐病，中抗穗腐病，感小斑病，高感灰斑病，感纹枯病，抗南方锈病。**建议：**（1）大豆玉

米带状复合种植推荐品种。（2）适宜我市海拔 800 米及以下的丘陵、平坝、低山地区种植。（3）适宜播种期 3 月中下旬，密度 2800~3200 株/亩。（4）注意防治纹枯病、大斑病、小斑病、灰斑病。

9、渝甜糯 990（国审玉 20220583）：南方（西南）鲜食糯玉米组出苗至鲜穗采收期 87 天，感丝黑穗病，高感纹枯病，高感小斑病。**建议：**（1）适宜在我市的丘陵、平坝、低山地区种植。（2）适宜播种期春播、夏播或秋播，密度 3200 株/亩左右。（3）与其他玉米品种空间隔离 200 米以上，花期时间隔离不少于 15 天。（4）注意防治纹枯病和小斑病。